



ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Фуцидин® – сокращенная версия

Действующее вещество: мазь (фузидат натрия – 20 мг), крем (фузидовой кислоты гемигидрат 20,4 мг (в пересчете на кислоту безводную – 20,0 мг)).

Лекарственная форма: мазь для наружного применения, крем для наружного применения.

Показания к применению: кожные инфекции, вызванные бактериями, чувствительными к фузидовой кислоте.

Противопоказания: гиперчувствительность к любому компоненту препарата.

Беременность и грудное вскармливание: системное воздействие незначительно, развития нежелательных лекарственных реакций не ожидается. Применение при беременности и лактации возможно, когда польза для матери превышает возможный риск для плода и ребёнка. При лактации не рекомендуется наносить на молочные железы.

Способ применения и дозы: наружно, тонким слоем 3-4 раза в день; при использовании марлевых повязок кратность можно уменьшить до 1-2 раз в день. Продолжительность курса лечения в среднем составляет 7-14 дней.

Побочное действие: нечасто – дерматит (в том числе контактный дерматит, экзема), сыпь (эритематозная, макулопапулезная, пустулезная, везикулярная, макулопапулезная и папулезная; также были случаи генерализованной сыпи), зуд, эритема, боль в месте нанесения (в том числе чувство жжения), раздражение в месте нанесения; редко – аллергические реакции, конъюнктивит, ангионевротический отек, крапивница, образование пузырей.

Особые указания: продолжительное применение или частые курсы лечения могут увеличить риск бактериальной резистентности и контактной сенсибилизации. С осторожностью наносить в периорбитальной области из-за риска раздражения глаз.

Условия отпуска: отпускают по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения: ЛЕО Фарма А/С, Дания

Регистрационный номер: П N011114/02, П N011114/03

1. Сергеев А.Ю., Бурцева Г.Н., Сергеева М.А. «Новые концепции и поиски решения проблемы стафилококковых инфекций в дерматологии». Иммунопатология, аллергология, инфектология 2019, №3:48-62; 2. Инструкция по медицинскому применению препарата Фуцидин® П N011114/02, П N011114/03; 3. Государственный реестр лекарственных средств <http://grls.rosminzdrav.ru>; 4. Winkelman W., Clin Dermatol 1989; 7(3):156-162; 5. Williamson DA, et al. Clin Microbiol Rev 2017;30(3):827-860; 6. Gelmetti C. Dermatol Ther 2008;21(3):187-195; 7. Long BH. Acta Derm Venereol 2008;Suppl 216:14-20.

ООО «ЛЕО Фармасыютикал Продактс» 125315, г. Москва, Ленинградский пр., д. 72, корп. 2
Тел.: +7 (495) 789-11-60, email: info.ru@leo-pharma.com www.leo-pharma.ru

Все претензии по содержанию данного промоционного материала, а также информация о нежелательных явлениях направляются в ООО «ЛЕО Фармасыютикал Продактс» по адресу: Россия, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 2, или по телефону: +7 (495) 789 1160, на e-mail: info.ru@leo-pharma.com.

Для специалистов здравоохранения

МАТ-64243-02-2023



Фуцидин®

Правило первой помощи



крем

мазь



LEO®

Фуцидин® — правило первой помощи при инфекциях кожи у взрослых и детей с рождения^{1,2}



Снижение иммунитета – частая причина развития бактериальной инфекции

При ограниченных очагах поражения наружное применение фузидовой кислоты в добавление к системной терапии основного заболевания помогает добиться быстрого терапевтического эффекта без побочных эффектов, особенно со стороны желудочно-кишечного тракта.

Пациент М., 39 лет

Диагноз:

В02. Опоясывающий герпес, осложненный пиодермией (L08.0)

Назначенное лечение:

Валацикловир 500 мг
по 1 таб. 2 раза в день
Фуцидин® крем
3-4 раза в день
до 10 дней



фото до лечения




фото после лечения

Преимущества антибиотиков местного применения, по сравнению с системными антибиотиками



Местное применение позволяет применять и разрабатывать средства, которые невозможно использовать системно (например, неомицин или бацитрацин)⁵



Меньший потенциальный риск системных нежелательных явлений и лекарственного взаимодействия^{5,6}



Возможность получения более высокой концентрации антибиотика на пораженном участке^{5,6}



Меньшее потенциальное воздействие на кишечную флору по сравнению с системными антибиотиками⁶



Возможность избежать необходимости в системных противомикробных препаратах⁵

Крем и мазь Фуцидин® продемонстрировали клиническую и биологическую эффективность, сопоставимую с другими средствами для местного применения и пероральными антибиотиками, но при их использовании отмечается меньшее количество нежелательных явлений⁷.