

# Подходы к лечению, принятые в передовой практике

## Рекомендации Британского Института Клинического Совершенства (NICE)\*

Фузидовая кислота является местным антибиотиком первого выбора при **импетиго** как у взрослых, так и у детей и подростков младше 18 лет.

- ✓ При назначении препаратов необходимо учитывать<sup>1</sup>:
  - что в лечении импетиго эффективны как местные, так и пероральные антибиотики;
  - предпочтения пациента, включая практические аспекты введения и возможные нежелательные эффекты;
  - резистентность к противомикробным препаратам может развиваться быстро при длительном или многократном применении местных антибиотиков.



Соматически здоровым взрослым, детям и подросткам в возрасте до 18 лет **с экземой, инфицированной вторичными бактериальными инфекциями**, не следует регулярно назначать местные противомикробные препараты<sup>2</sup>.

- ✓ Тем не менее, в случае необходимости рекомендуемым местным антибиотиком является фузидовая кислота<sup>2</sup>.
- ✓ NICE не рекомендует применение альтернативного местного антибиотика при экземе с вторичной бактериальной инфекцией, поскольку в случае невозможности применения или неэффективности фузидовой кислоты предпочтителен пероральный антибиотик.



**LEO®** 

ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс» 125315, г. Москва, Ленинградский пр., д. 72, корп. 2  
Тел.: +7 (495) 789-11-60, email: [info.ru@leo-pharma.com](mailto:info.ru@leo-pharma.com) [www.leo-pharma.ru](http://www.leo-pharma.ru)

Все претензии по содержанию данного промоционального материала, а также информация о нежелательных явлениях направляются в ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс» по адресу: Россия, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 2, или по телефону: +7 (495) 789 1160, на e-mail: [info.ru@leo-pharma.com](mailto:info.ru@leo-pharma.com).

Для специалистов здравоохранения

МАТ-64246-02-2023

# Фуцидин® – правило первой помощи при инфекциях кожи у взрослых и детей с рождения<sup>3,4</sup>

## Общие сведения

Возраст пациента: 27 лет,  
пол пациента: женский

## Диагноз:

Импетиго (L01.0)

## Назначенное лечение:

Фузидовая кислота 2%  
(Фуцидин® крем), 3 р/д,  
10 дней.

ФИО врача, предоставившего  
случай: Тунчик А.С.

Город: Курск



*до лечения*



*9-й день лечения*

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Фуцидин® – сокращенная версия

**Действующее вещество:** мазь (фузидат натрия – 20 мг), крем (фузидовой кислоты гемигидрат 20,4 мг [в пересчете на кислоту безводную – 20,0 мг]).

**Лекарственная форма:** мазь для наружного применения, крем для наружного применения.

**Показания к применению:** кожные инфекции, вызванные бактериями, чувствительными к фузидовой кислоте.

**Противопоказания:** гиперчувствительность к любому компоненту препарата.

**Беременность и грудное вскармливание:** системное воздействие незначительно, развития нежелательных лекарственных реакций не ожидается. Применение при беременности и лактации возможно, когда польза для матери превышает возможный риск для плода и ребенка. При лактации не рекомендуется наносить на молочные железы.

**Способ применения и дозы:** наружно, тонким слоем 3-4 раза в день; при использовании марлевых повязок кратность можно уменьшить до 1-2 раз в день. Продолжительность курса лечения в среднем составляет 7-14 дней.

**Побочное действие:** нечасто – дерматит (в том числе контактный дерматит, экзема), сыпь (эритематозная, макулопапулезная, пустулезная, везикулярная, макулопапулезная и папулезная; также были случаи генерализованной сыпи), зуд, эритема, боль в месте нанесения (в том числе чувство жжения), раздражение в месте нанесения; редко – аллергические реакции, конъюнктивит, ангионевротический отек, крапивница, образование пузырей.

**Особые указания:** продолжительное применение или частые курсы лечения могут увеличить риск бактериальной резистентности и контактной сенсибилизации. С осторожностью наносить в периорбитальной области из-за риска раздражения глаз.

**Условия отпуска:** отпускают по рецепту.

**Владелец регистрационного удостоверения:** ЛЕО Фарма А/С, Дания

**Регистрационный номер:** П N011114/02, П N011114/03

<sup>\*</sup>NICE (National Institute for Health and Care Excellence) – Национальный институт здравоохранения и повышения квалификации Великобритании

1. <https://www.nice.org.uk/guidance/ng190>; 2. Экзема, инфицированная вторичными бактериальными инфекциями, и другие частые кожные заболевания: противомикробные препараты. Руководство NICE, март 2021 г. Доступно по ссылке: [www.nice.org.uk/guidance/ng190](https://www.nice.org.uk/guidance/ng190). Дата просмотра: март 2023 г.; 3. Инструкция по медицинскому применению препарата Фуцидин® П N011114/02, П N011114/03; 4. Сергеев А.Ю., Бурцева Г.Н., Сергеева М.А. «Новые концепции и поиски решения проблемы стафилококковых инфекций в дерматологии», Иммунопатология, аллергология, инфектология 2019, №3: 48-62.