

Фуцикорт®

Фуцикорт® – эффективное лечение дерматитов, осложненных бактериальной инфекцией. Синергия фузидовой кислоты и ТГКС.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА Фуцикорт®  
– сокращенная версия

**Действующие вещества:** Фузидовая кислота безводная – 20,0 мг; Бетаметазон – 1 мг. **Лекарственная форма:** крем для наружного применения. **Показания к применению:** применяют при воспалительных дерматозах с бактериальной инфекцией или при подозрении на бактериальную инфекцию. **Противопоказания:** гиперчувствительность, системные грибковые инфекции, грибковые, вирусные и туберкулезные инфекции кожи, розацеа, периоральный дерматит, детский возраст до 1 года. **Беременность и грудное вскармливание:** не следует применять во время беременности, за исключением случаев, когда этого требует клиническое состояние женщины. Можно применять при грудном вскармливании, но не следует наносить на молочные железы. **Способ применения и дозы:** наружно, 2 раза в день; курс не более 2 недель. При нанесении под повязку можно уменьшить кратность. **Побочное действие:** гиперчувствительность, различные неприятные ощущения (раздражение, зуд и т.д.), высыпания и отек в месте нанесения, контактный дерматит, обострение экземы, крапивница, местные и системные побочные эффекты, характерные для класса глюкокортикостероидов. **Особые указания:** избегать длительной непрерывной терапии. С осторожностью применять в области вокруг глаз, при беременности и у детей старше 1 года. Избегать попадания в открытые раны и на слизистые оболочки. **Условия отпуска:** отпускают по рецепту. **Владелец регистрационного удостоверения:** ЛЕО Фарма А/С, Дания. **Регистрационный номер:** П N 011628/01

Список литературы:

1. Laporte JR. Principios básicos de la investigación clínica. Boletín Oficial del Estado. 1993; 114(1):1-212. 2. Girolomoni G, Mattina R, Manfredini R, Vertuani S, Fabrizi G. Fusidic acid betamethasone lipid cream. Int J Clin Pract. 2016; 70 (184): 4–13. 3. Schultz Larsen F. An Efficient New Formulation of Fusidic Acid and Betamethasone 17-Valerate (Fucicort® Lipid Cream) for Treatment of Clinically Infected Atopic Dermatitis. Acta Derm Venereol 2007; 87: 62–68. 4. Eichenfield LF, et al. Management and treatment of atopic dermatitis with topical therapies. J Am Acad Dermatol. 2014;71:116-32. 5. Rhen T, Cidlowski JA. Antiinflammatory Action of Glucocorticoids – New Mechanisms for Old Drugs. N Engl J Med. 2005;353:1711-23. 6. Collignon P, Turnidge J. Fusidic acid in vitro activity. International Journal of Antimicrobial Agents 12 (1999) S45–S58. 7. Schöfer H, Simonsen L. Fusidic acid in dermatology: an updated review. Eur J Dermatol 2010; 20 (1): 6-15.

Для специалистов здравоохранения  
ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс» 125315, Москва, Ленинградский пр., д. 72, корпус 2  
Тел.: +7 (495) 789-11-60, e-mail: info.ru@leo-pharma.com, www.leo-pharma.ru  
Все претензии по содержанию данного промоционного материала, а также информация о нежелательных явлениях направляются в ООО «ЛЕО Фармасьютикал Продактс» по адресу: Россия, 125315, Москва, Ленинградский проспект, дом 72, корпус 2 – или по телефону: +7 (495) 789 1160, e-mail: info.ru@leo-pharma.com.



MAT-58737-07-2022



Фуцикорт®

Фуцикорт® – эффективное лечение дерматитов, осложненных бактериальной инфекцией. Синергия фузидовой кислоты и ТГКС.

Комбинация, в которой **сильный** противовоспалительный эффект стероида **дополняет антимикробную активность**<sup>3</sup>

Бетаметазона валерат

Стероид  
2 класса активности<sup>4</sup>

Подавляет воспаление и зуд<sup>5</sup>



Фузидовая кислота

Антибиотик, заточенный  
против кожных патогенов<sup>6</sup>

Уменьшает обсемененность  
*S. aureus*<sup>2</sup>

схема применения  
2 раза в день  
не более  
2-х недель





**Фуцикорт®**

Фуцикорт® – эффективное лечение дерматитов, осложненных бактериальной инфекцией. Синергия фузидовой кислоты и ТГКС.

## Эффективность по сравнению с другими комбинациями



- ✓ Более выраженный клинический ответ<sup>7</sup>
- ✓ Быстрое снятие симптомов<sup>7</sup>

Сравнение различных комбинаций по клиническому эффекту в лечении дерматитов, осложненных бактериальной инфекцией.


Tomado de: Schöfer H, Simonsen L. Fusidic acid in dermatology: an updated review. Eur J Dermatol 2010; 20 (1): 6-15.



**Фуцикорт®**

Фуцикорт® – эффективное лечение дерматитов, осложненных бактериальной инфекцией. Синергия фузидовой кислоты и ТГКС.

## Схема лечения атопического дерматита<sup>1</sup> (международный опыт)



- а. Если нет признаков инфекции — **Адвантан®** 7–10 дней 1 раз в день  
б. Если есть признаки инфекции — **Фуцикорт®** до устранения признаков инфекции (обычно 7–10 дней) 2 раза в день
- Переход на **Протопик®** 2 раза в день до исчезновения признаков обострения
- Ежедневное применение эмолентов
- При первых признаках обострения **Протопик®** 2 раза в день — стартовая терапия обострения, если обострение выраженное — начать с 1
- В период ремиссии - **Протопик®** по схеме 2 раза в неделю (у пациентов с 4 и более обострениями в течение года)

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Протопик® ЛСР-001885/10; Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Фуцикорт® П N 011628/01; Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Адвантан® П N013563/03, П N013563/04, П N013563/01, П N013563/02





## Approval Signatures

**Name:** Буклет Фуцикорт

**Id:** MAT-58737

**Version:** 1

**Status:** Approved

**Product:** Fucicort®

**Form:**

**Strength:**

**Region/Country:** Russian Federation

**Target Audience:** Healthcare Professionals (HCPs)

**Description:** Детализация состава, преимущества перед комбинацией бетаметазона дипропионат+гентамицин, общая схема терапии АтД

Document Approvals	
Vera Grebenkina (VEGRE)	Regulatory - 15-Jul-2022 05:17:31 GMT+0000
Dmitry Petrunin (DYPRU)	Scientific/Medical Affairs - 21-Jul-2022 23:13:28 GMT+0000
Igor Galaburda (IGRSE)	Management - 22-Jul-2022 06:50:14 GMT+0000