

Фуцидин®

Экспертное решение при инфекциях кожи у взрослых и детей с рождения^{1,2}

Сравнительная оценка препарата Фуцидин® с другими топическими антибиотиками¹⁻⁶

	Фуцидин®	Мупироцин	Неомицин	Бацитрацин	Гентамицин	Тетрациклин
Высокая активность в отношении золотистого стафилококка ¹	✓	✓	=	✓	✓	✗
Отсутствие кросс-резистентности ²	✓	✓	✗	✓	✗	✗
Высокая проникающая способность ^{3,4}	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Низкий потенциал развития аллергических реакций ⁵	✓	✓	✗	✗	✗	✓
Низкий потенциал НЛР ⁶	Редко	Редко	Ототоксичность и нефротоксичность ⁶	Недостаточно исследованы	Ототоксичность и нефротоксичность	✗



доказано



дискутабельно



не имеет данного преимущества

Планета пациента под защитой!



Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Фуцидин®

Действующее вещество: мазь (фузидат натрия – 20 мг), крем (фузидовой кислоты гемигидрат 20,4 мг (в пересчете на кислоту безводную – 20,0 мг)).

Лекарственная форма: мазь для наружного применения, крем для наружного применения.

Показания к применению: кожные инфекции, вызванные бактериями, чувствительными к фузидовой кислоте.

Противопоказания: гиперчувствительность к любому компоненту препарата.

Беременность и грудное вскармливание: системное воздействие незначительно, развития нежелательных лекарственных реакций не ожидается. Применение при беременности и лактации возможно, когда польза для матери превышает возможный риск для плода и ребёнка. При лактации не рекомендуется наносить на молочные железы.

Способ применения и дозы: наружно, тонким слоем 3–4 раза в день; при использовании марлевых повязок кратность можно уменьшить до 1–2 раз в день. Продолжительность курса лечения в среднем составляет 7–14 дней.

Побочное действие: нечасто – дерматит (в том числе контактный дерматит, экзема), сыпь (эритематозная, макулопапулезная, пустулезная, везикулярная, макулопапулезная и папулезная; также были случаи генерализованной сыпи), зуд, эритема, боль в месте нанесения (в том числе чувство жжения), раздражение в месте нанесения; редко – аллергические реакции, конъюнктивит, ангионевротический отек, крапивница, образование пузырей.

Особые указания: продолжительное применение или частые курсы лечения могут увеличить риск бактериальной резистентности и контактной сенсибилизации. С осторожностью наносить в периорбитальной области из-за риска раздражения глаз.

Условия отпуска: отпускают по рецепту.

Владелец регистрационного удостоверения:

ЛЕО Фарма А/С, Дания

Регистрационный номер: П N011114/02, П N011114/03



НЛР – нежелательные лекарственные реакции.

1. EUCAST. Fusidic acid/S. aureus MIC distribution. <https://miceucast.org/Eucast2/regShowjsp?id=2954>. Accessed February 2018.
2. Schoefer H. & Simonsen L. Eur J Dermatol 2010; 20(1): 6–15. 3. Knight A.G. et al. Br J Dermatol 1969; 81(Suppl 4): 88–91. 4. Stüttgen G. & Bauer E. Drug Res 1998; 38(5): 730–735. 5. Morris S.D. et al. B J Dermatol 2002; 146(6): 1047–51. 6. Schoefer H. et al. Eur J Dermatol 2010 20(1): 6–15. 7. Инструкция по медицинскому применению препарата Фуцидин®. П N011114/02, П N011114/03. 8. Winkelman W. Clin Dermatol 1989; 7(3): 156–162. 9. Государственный реестр лекарственных средств <http://grls.rosminzdrav.ru>, 15–02–2024



Информация для специалистов здравоохранения
ООО «ЛЕО Фарма» Юткарт Продактс® 125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 72, корп. 2.
Тел.: +7 (495) 789-1160; info.rus@leo-pharma.com • www.leo-pharma.ru
MAT-71524-02-2024



Approval Signatures

Name: Фуцидин_Листовка Фуцидин vs другие антибиотики

Id: MAT-71524

Version: 2

Status: Approved

Product: Fucidin®

Form:

Strength:

Region/Country: Russian Federation

Target Audience: Healthcare Professionals (HCPs)

Description: Листовка_Фуцидин vs другие антибиотики

Document Approvals	
Vera Grebenkina (VEGRE)	Regulatory - 26-Feb-2024 19:21:41 GMT+0000
Dmitry Petrunin (DYPRU)	Scientific/Medical Affairs - 27-Feb-2024 23:34:36 GMT+0000
Igor Galaburda (IGRSE)	Management - 28-Feb-2024 06:31:03 GMT+0000